

# TEST DI VALUTAZIONE DEL CORSO "ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE"

(SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE)

**11** - Dopo questo corso potete utilizzare un AED per attuare il soccorso a un infortunato in arresto cardiaco improvviso?

- Sì, in quanto è facile usarlo.  No, sebbene l'AED sia molto utile, per usarlo bisogna prima seguire un apposito corso.

**12** - Se un infortunato non risponde agli stimoli tattili-vocali quale azione dovete fare per prima?

- Correre a cercare un AED.  Chiedere a voce alta l'aiuto dei presenti.  Chiamare subito il numero di gestione delle emergenze.

**13** - Se un infortunato respira in modo superficiale, senza che il torace si sollevi, oppure boccheggia solamente, come dovete considerarlo ai fini della valutazione primaria?

- Con respirazione e circolazione assenti.  Con respirazione assente e circolazione presente.  Con respirazione e circolazione presenti.

**14** - Potete praticare le tecniche di rianimazione a infortunato disteso supino su un divano?

- Sì.  No, serve che sia disteso supino su un piano rigido.

**15** - In quale delle seguenti situazioni non è corretto interrompere la rianimazione?

- Pericolo imminente per l'APSA.  L'infortunato sembra ormai morto.  Esaurimento delle forze dell'APSA.

**16** - Quale delle seguenti azioni non è corretta se un APSA non dispone al momento di un foglio barriera o di una pocket-mask?

- Usare la procedura CAB usuale con la respirazione bocca a bocca.  Effettuare le sole compressioni.  Non praticare la rianimazione.

**17** - Oltre al foglio barriera e a una pocket-mask quale altra attrezzatura dovrebbe essere sempre facilmente disponibile all'APSA?

- AED.  Guanti monouso.  Kit per respirazione di ossigeno.

**18** - Nel caso di una donna in avanzato stato di gravidanza quali precauzioni bisogna prendere prima di effettuare la rianimazione?

- Effettuare il dislocamento dell'utero.  Spostare leggermente in alto il punto di pressione.  Entrambe le precedenti sono precauzioni da adottare.

**19** - In quali dei seguenti casi la respirazione di ossigeno è efficace?

- Edema polmonare acuto.  Ferite profonde al torace.  Inalazione di gas tossici.  In tutti i precedenti casi

**20** - Se alla valutazione primaria l'APSA verifica che l'infortunato è incosciente ma respira, come deve posizionarlo?

- In posizione laterale di sicurezza  Supino su piano rigido.  Prono su piano rigido.

**Dichiaro di avere rivisto con il Docente tutte le risposte errate di avere pienamente compreso i miei errori, ricevendo esaurienti risposte a tutti i miei dubbi.**

Nome e cognome del partecipante: \_\_\_\_\_

Data e luogo: \_\_\_\_\_

Firma (leggibile) del partecipante: \_\_\_\_\_